

Verfuche über Beeinflussung des Wachstums bösartiger Geschwülste durch experimentell erzeugte Obliteration der Lymphbahnen des Geschwulstbettes.



In a u g u r a l - D i s s e r t a t i o n
zur Erlangung
der Doktorwürde
der Hohen Medizinischen Fakultät
der Rheinischen Friedrich Wilhelms-Universität
zu Bonn.

Vorgelegt am 15. Oktober 1936
von
B o d o K o c h
aus Krefeld.

Bonn 1936
Anton Brand, Bonn.

Gedruckt
mit Genehmigung der medizinischen Fakultät
der Universität Bonn

Referent: Prof. Dr. Freiherr v. Redwitz.



Zwei Fälle¹ — nicht veröffentlicht — einer kürzlich beobachteten Heilwirkung eines spontanen, interkurrenten Erysipels auf ein primäres Hautsarkom des Gesichtes in der Schläfengegend (histologisch Spindelzell Sarkom) und ein primäres Hautkarzinom der Ferse (histologisch Basalzellenca.) gaben Veranlassung, die heilsame Wirkung des Erysipels noch einmal zu überprüfen, um evtl. diese Heilwirkung zu wiederholen.

Beobachtungen über die curative Wirkung spontaner Erysipels sind nicht neu. Die erste Beschreibung stammt anscheinend von dem Berliner Arzt Busch² (1866); weitere gaben Durante³, Mosengeil⁴, Biedert⁵, Bruns⁶, Gerster⁷, Bull⁸, Hutchinson⁹, Fenney¹⁰, Kleeblatt¹¹ u. a. Eine zusammenfassende kritische Besprechung von Bruns versucht diesen heilenden Einfluß zu deuten. Unter Ablehnung der älteren Ansicht — allenfalls historisch interessant — nach der das Zellmaterial bösartiger Neoplasmen (sowie auch leucischer und lupöser Gewebsveränderungen, die gelegentlich einmal durch Erysipel günstig beeinflusst werden sollen) nach erheblicher initialer Leukotaxis und anschließendem rapiden fettigen Leukozytenzerfall „per infectionem“ in den gleichen Degenerationsprozeß gezogen würde, dem eine beendende Resorption folge, nahm Bruns an, daß die Erysipelkokken die krankhaft veränderte Zelle angriffen und zum Zerfall brächten.

Diese Erklärung ist infolge der ungenauen pathologischen und biologischen Voraussetzungen nicht zutreffend.

Immerhin suchte man in der Folge das Erysipel zur Therapie inoperabler Krebsfälle nutzbar zu machen. Nach der Entdeckung des — wie man glaubte — spezifischen Erysipelkokkus durch Fehleisen wurde ein Versuch nach dem andern angestellt, durch intrakutane Injektion von Aufschwemmungen Fehleisenscher Kulturen ein Erysipel zu erzeugen. Leider verursachte eine derartige Injektion nur sehr selten eine fortschreitende eitrige Lymphangitis;

die Wirkung beschränkte sich in der Regel auf eine kutane und subkutane Abszeßbildung am Ort des Depots.

Als Grund der mangelhaften Erfolge mag anzusehen sein, daß die Züchtung der in ihrer Virulenz genügend herabgesetzten Kokken nicht gelingt¹², außerdem dürften jahreszeitliche Einflüsse eine Rolle spielen — das Erysipel tritt mancherorts, z. B. am Niederrhein im Frühjahr und Herbst häufiger als in den anderen Jahreszeiten auf. Vielleicht wirkt die „Abkühlungsgröße der Luft“ (der fogen. Katawert) auf ihre Weise mit; die Klärung ihres physiologischen Einflusses ist noch nicht weit fortgeschritten, sie verspricht interessante Ergebnisse. Schon Pasteur hat gezeigt, daß normalerweise gegen Milzbrand resistente Vögel infiziert werden, wenn man ihre Temperatur von 41—42° C auf 37° C herabsetzt¹³.

Da es nicht möglich war, ein curatives Erysipel durch gewollte Infektion zu erzielen, versuchte man Heilung mit Toxinen oder den Immunseren von streptococcus erysipelatus zu bringen. In der Literatur finden sich Berichte von Emmerich und Scholl¹⁴, Richet und Hericourt¹⁵, Coley¹⁶, Czerny (Heidelberg)¹⁷, Lassar¹⁸, Sprouk¹⁹, Friedrich²⁰, Winberg²¹, u. a. Zusammenfassend läßt sich sagen, daß die Prüfer durch die Einwirkungen der verschiedenen Seren oder Toxine anfänglich Erfolge in Form einer Verkleinerung der Geschwulst feststellen konnten, aber nach kurzer Dauer folgte stets ein beschleunigtes und schrankenloses Weiterwuchern. Außerdem hatte die Injektion von Stoffen, die oft nur unvollkommen von noch virulenten Bakterien befreit werden konnten, in verschiedenen Fällen derartig alarmierende Symptome zur Folge, daß diese Therapie als zu gefährlich abgelehnt werden mußte.

Der praktischen Anwendung wurde so ein Ziel gesetzt; doch bemühte man sich weiterhin um Klärung der Heilwirkung. Kaposi²² sah das bei der Rose auftretende hohe Fieber als wichtigsten Faktor an, eine Ansicht, die später von Strasser²³ erneut ausgesprochen wurde. (Nach ihm tritt auch an Stellen, die das Erysipel gar nicht erreicht hat, eine Wirkung auf. Diese Beobachtung bestimmt falsch, sie wurde auch nicht bestätigt.) Wolfheim²⁴

glaubte in neuester Zeit die Einwirkung der Erysipelkokken als unspezifisch „in ihrer Eigenschaft als artfremde Eiweißkörper wirkend“ erklären zu können.

Die Ansicht von Kaposi und Strasser kann ich nicht teilen. Es ist möglich, daß höheres Fieber durch Aktivierung der antiblastischen Kräfte des RES. den Verlauf der Tumorerkrankung vorübergehend günstig beeinflussen kann. Vielleicht sind auch die anfänglichen Erfolge der oben erwähnten Sero- und Toxithera-
pie auf eine derartige Mobilisierung des RES. durch die den Injektionen folgenden Fieberanfälle (Serum-, Toxin-, artfremde Eiweißwirkung!) zu erklären. Auch bei manchen anderen fieberhaften Erkrankungen z. B. Malaria sehen wir eine gewisse Beeinflussung des Tumors²⁵. Das ist aber nie Heilung, wie sie nach einer ganzen Reihe von Fällen nach Erysipel von zuverlässigen Autoren eindeutig beschrieben und auch selber beobachtet worden ist.

Auch die Ansicht Wolfheims ist abzulehnen. Er führt die Heilwirkung des Erysipels auf eine artfremde Eiweißwirkung zurück. Diese Möglichkeit besteht selbstverständlich, doch ist nicht einzusehen, warum dieser gleiche Heilungseffekt nicht auch bei anderen Streptokokkenerkrankungen, die ebenfalls mit hohem Fieber einhergehen können, eintritt. Die Identität des gewöhnlichen streptococcus pyogenes mit dem Streptokokkus Fehleisen ist nachgewiesen; Petrůchka erzielte einmal bei zwei Carcinompatienten durch Impfung mit Streptokokken, die aus peritonitischem Eiter gezüchtet waren, ein echtes Erysipel.

Unspezifische Gründe können also nicht allein für die beobachteten Heilungen maßgebend sein, es muß noch ein anderes, auf den Tumor direkt einwirkendes Moment hinzukommen. Das dürfte die im Verlauf eines E. auftretende Verstopfung der Lymphkapillaren und -präkapillaren des Geschwulstbettes sein, die die Ernährung des Tumors so weit schädigt, daß er „abwelkt“, wie ein älterer Autor treffend sagte. Die Bedingungen dieses „Abwelkens“, also der Nekrose des Geschwulstgewebes lassen sich durch das Studium der Ernährungsbedingungen des Tumors im allgemeinen und des pathologisch veränderten Gewebes erklären.

Ausschluß von der Blutversorgung kann einen Tumor nicht wesentlich schädigen. Entsprechende Versuche wurden verschiedentlich bekannt gegeben, am besten sind wohl die von D u f c h l ²⁶. Er impfte Ratten mit einem Spindelzellfarkom auf beide Hinterbeine und nahm an einem Bein wechselweise Durchtrennungen am Gefäß-Nervengerüst vor. Der Tumor des anderen Beines, das von Eingriffen ganz verschont blieb, diente zur Kontrolle. Er erzielte durch diese atrophische Ligatur, die eine O₂-Versorgung der peripheren Teile einschließend des Tumors unmöglich machte, eine von den Zehen aufsteigende Nekrose der Extremität; der Tumor blieb aber unbeeinflusst, d. h. er zeigte keine stärkere zentrale Nekrotisierung als gewöhnlich und blieb vor allem mit normaler Ausbeute transplantabel.

Wir wissen nun, daß Schnitte des Flexner-Carcinoms nach 24stündigem, Schnitte des Jensen-Sarkoms nach 72stündigem Sauerstoffmangel mit normaler Impfausbeute transplantabel, d. h. ungeschädigt sind, falls während des O₂-Mangels Glukose zur Verfügung stand (O k a m o t o) ²⁷. Umgekehrt genügt auch die Atmung ohne Gärung — also ohne Glukose — um das Leben der Tumorzelle zu erhalten, wie die Versuche von Warburg, Wind und Negelein ²⁸ beweisen. Nach den Ergebnissen der gleichen Autoren genügt aber eine nur 4stündige Unterbrechung beider energieliefernden Faktoren (des Atmungsauerstoffs und der Gärungsglukose), um die Tumorzellen abzutöten. Der Beweis wurde durch Einbringung der Tumorschnitte nach der bekannten Warburgschen Methode in O₂- und glukosefreies Serum erbracht; es ergab sich, daß nach vier Stunden ein meßbarer Stoffwechsel nicht mehr bestand.

Vergleichen wir die Ergebnisse der Warburgschen Schule mit den chirurgischen Versuchen, so können wir als gesichert annehmen, daß die Atmung durch die Ligatur der Gefäße ausgeschaltet wurde. Weiterhin muß die Versorgung mit Glukose durch das strömende Blut ebenso sistieren, und trotzdem erscheinen die Geschwulstzellen in ihrer Ernährung nicht gestört.

Die Vermutung muß sich aufdrängen, daß der Tumor dann auf Wegen, die der Ernährung normalerweise nicht dienen, seine energieliefernden Stoffe bezieht. Es bleiben anatomisch nur die Lymphbahnen des Geschwulstbettes übrig. Sie können nicht den für den Atmungsstoffwechsel nötigen Sauerstoff enthalten, aber ihre Lymphe führt alle die Stoffe, die für die Glykolyse notwendig sind (P e t e r s e n , J a f f e , L e w i n s o h n und H u g h e s) ²⁹. Die Geschwulstzellen filtern sie ab und verwenden sie zur Energielieferung nach ihrem eigenen Stoffwechsel durch Abbau bis zur Milchsäure. Werden diese Wege auch verstopft, so sistiert die Nährstoffbeschaffung für den Tumor gänzlich — und das ist die Wirkung des interkurrenten Erysipels. Das wird aus der Beschreibung der Hautveränderungen, die diese Krankheit verursacht, verständlich.

Das Erysipel ist ein eitriger Entzündungsprozeß der Haut mit fortschreitender Lymphangitis, Phlebitis und Thrombophlebitis (K u l e n k a m p f) ³⁰. Die Krankheit hinterläßt, besonders bei der chronischen rezidivierenden Form — und gerade diese hat nach der alten klinischen Erfahrung die günstige Einwirkung auf Geschwülste — typische Veränderungen der Haut. Der Beginn der Erkrankung zeichnet sich durch eine auffallende Zirkulationsstörung in der Cutis aus. Die Lymphgefäße sind erweitert, in ihnen finden sich Kokkenkolonien, reichlich Leukozyten und Fibrin bis zur fibrinösen Thrombenbildung. Charakteristische Veränderungen erleidet die kollagene Substanz, die zunächst Erweichung, später Gerinnung zeigt, (U n n a) ³¹. Die Haut, die bis jetzt eine weiche teigige Beschaffenheit besaß, verhärtet sich, sie tritt in das Stadium der „harten Elephantiasis“ (U n n a). Es kommt zu einem Bild, das man mit der Perilymphangitis fibrosa (A c k e r k n e c h t u. K r a u f e) ³² vergleichen könnte. Kollagene Faserelemente und Bindegewebe werden reichlich neu gebildet. Die Wandungen der Lymphbahnen werden verdickt, eingeengt, in der Folge durch die weitere Wucherung des perivaskulären Gewebes stenotisiert bis zur völligen Verödung (W i n k l e r) ³³. Im Endstadium ist die Haut holzähnlich verdickt, die Schnittfläche erscheint als breite Bindegewebschwarte (K i t t) ³⁴ oder als „solides Oedem“ (D e l b a n c o u. C a l l o m o n) ³⁵. Zum

Stoffaustausch ist sie ganz ungeeignet. Die Geschwulst, die in diese undurchlässige Schwarte eingebettet ist, kann weder die zur Atmung noch die zur Glykolyse erforderlichen Stoffe erhalten und stirbt ab. [Nach Warburg ist die Empfindlichkeit des Tumors in toto (also nicht der isolierten Tumorzelle) gegenüber der Empfindlichkeit von Normalgewebe auf Ernährungsstörungen deutlich erhöht.]

Die Obliteration der Lymphbahnen des Geschwulstbettes müßte auch den lymphogenen Weitertransport von Geschwulstzellen aus dem Geschwulstbereich verhindern können. (Allerdings besteht in der experimentellen Krebsforschung über die Ausbreitungswege der Geschwülste im Gegensatz zur Klinik noch keineswegs eine einheitliche Auffassung!)

Eine Ansicht stammt von Goldmann³⁶, der in seinen „Anatomischen Untersuchungen über die Verbreitungswege bösartiger Geschwülste“ folgendes feststellt: „Bei Sarkomen und Carcinomen werden schon im primären Tumor Blutgefäße, speziell die Venen von der Neubildung betroffen. Eine Verschleppung von Geschwulstzellen durch die Blutwege kann also bei Carcinom und Sarkom direkt, ohne Lymphgefäße eintreten.“ Es ist fraglich, ob diese Arbeit nicht zu sehr den pathologisch-anatomischen Befund, also das Schlußstadium in den Vordergrund schiebt. Selbstverständlich arrodirt die Geschwulst bei ihrem ungeordneten Wachstum die Gefäße, die in ihrem Wege stehen, es kommt auch zu Thromben von Geschwulstmassen, die sich lösen und durch Verschleppung eine Metastase da, wo sie hingeschwemmt wurden, bilden können. Das ist aber nicht der einzige Weg einer metastatischen Ausbreitung einer Geschwulst.

Es kann nicht im Rahmen dieser Arbeit liegen, die ganze Literatur dieser Frage mit ihrem für und wider zu besprechen. Ich weise hier nur auf die ausgedehnten Experimente von Flacks³⁷ hin, der Rattenfäuglinge in die Muskulatur des Obersehenkels impfte und die bei den jungen Tieren mit großer Regelmäßigkeit auftretenden Lymphdrüsenmetastasen mit dem Primärtumor zusammen so in Serienschnitte zerlegte, daß er das ganze ergriffene Gebiet bis weit ins Gefunde verfolgen und untersuchen konnte.

Er tötete seine Tiere in verschiedenen Zeitabschnitten nach der bei allen gleichmäßig vorgenommenen Impfung und erhielt folgende Resultate: „Schon einige Tage nach der Impfung sind in der Lymphdrüse der geimpften Seite Zellen nachzuweisen, die aus dem zur Impfung verwendeten Sarkom stammen. Die Zellen befinden sich kurz nach der Impfung nur im Marginalsinus an der Einmündung der Lymphgefäße. Bei längerem Bestehen der Geschwulst rücken sie in den Intermediärsinus ein. Die zweite Drüse, die die Lymphe aus dem normalen Oberschenkel sammelt, enthält diese Zellen nicht. Es ist also offensichtlich, daß die Verbindung durch die Lymphgefäße, nicht durch die Venen gegeben ist, sonst müßte die Metastase auch in der anderen Seite sein.“

Es wurden bekanntlich Versuche gemacht (K ü m m e l jr. u. a.), die Metastasenbildung durch Freilegung des Ductus thoracicus und Absaugung der Lymphe nach außen zu verhindern. Der Grundgedanke war jedenfalls, die krebsigen Elemente nicht in den Blutstrom gelangen zu lassen, der sie im ganzen Körper verteilt. Erfolge konnte diese Therapie nicht haben, die zur Hervorbringung einer Metastase geeigneten Zellen werden bereits in den Filterapparaten der einzelnen regionären Drüsen zurückgehalten und können sich dort ansiedeln.

Eine unmittelbare Verlegung des Geschwulstbettes durch Lymphbahnobliteration müßte die metastatischen Zell-Elemente schon vor den filternden Lymphknoten auffangen können und immobilisieren. Ebenso müßte diese Verlegung den Übertritt abnormer Stoffwechselprodukte in den Körperkreislauf zum Teil verhindern, d. h. dem Entstehen der Krebskachexie entgegenwirken.

Diese theoretischen Vorstellungen über den Einfluß der Lymphbahnverstopfung auf Geschwülste wurden experimentell untersucht.

Um ein Krankheitsbild ähnlich dem des Erysipels zu erzeugen, wurden Versuche mit Bac. Novyi (auf Anfrage empfohlen von Herrn Prof. Dr. Mießner-Hannover) und Saccharomyces farciminosus (empfohlen von Herren Prof. Zwick-Gießen und Schnürer-Wien) angestellt.

Versuchstiere waren Ratten und weiße Mäuse, die künstlich

ge setzte Impftumoren (Spindelzellenfarkom und Rouxcarcinom trugen. Die Ausgangstumoren stammen aus den wissenschaftlichen Laboratorien der I.G. Farbenindustrie A.G. in Elberfeld.

Zur Überimpfung bewährte sich folgendes Verfahren:

Von einem unmittelbar vorher getöteten Tiere wurde unter aseptischen Kautelen frisches Tumorgewebe peripher entnommen und unter Kühlung mit der 15fachen Menge steriler physiologischer Kochsalzlösung in einer Reibschale zerrieben. Es entsteht ein dünnflüssiger, durch Spuren beigemengten Blutes rot gefärbter Zellbrei, der mit einer dicken Kanüle in eine Injektionspritze aufgesaugt werden kann. Die zu impfenden Tiere wurden enthaart, die Haut mit Jodtinktur eingerieben und 0,1 ccm der Zellaufschwemmung injiziert. Als Ort der Geschwulstansetzung wurde Oberschenkel oder mittlerer Rücken gewählt. Sowohl bei der Sarkom- als auch der Ca-Impfung ergab sich eine positive Impfausbeute von 95% aller Tiere, die restlichen waren auch bei wiederholter Impfung (dreimal vorgenommen) resistent. Nach 12 bis 14 Tagen hatte der Tumor regelmäßig etwa Kirschkerngröße erreicht; innerhalb von 7—8 Wochen wuchs er auf das 3—4fache Volumen an. In diesem Stadium gingen die unbehandelten Mäuse ein, allerdings ohne vorherige Kachexieerscheinungen zu zeigen. Die Ratten trugen bei gleicher Dauer (insgesamt 9—10 Wochen) Tumoren von Hühner- bis Enteneigröße. Metastasen traten bei unbehandelten Tieren häufig in Form benachbarter subkutaner Tumoren auf, nie an inneren Organen. Spontane Rückbildungen habe ich nicht gesehen.

Auf dem Durchschnitt ließen sich makroskopisch mehrere Schichten unterscheiden: In der Mitte die zentrale Einschmelzungszone, daran grenzend eine Nekrofenschicht, am Rande frisches Tumorgewebe mit bindegewebiger Abkapslung. (Zur Überimpfung verwendbar!) Diese zarte Kapfel ist bei Rattenfarkomen üblich, weniger ausgeprägt ist sie beim Mäuscarcinom. Die Geschwulst wächst meist nach zwei Richtungen destruierend weiter, gewöhnlich gegen Haut und Muskulatur oder gegen Wirbelsäule und Rippen. Mikroskopisch zeigten sich bei dem Sarkom die bekannten regellosen Spindelzellenzüge; die Größe der einzelnen Zellen schwankt

in weiten Grenzen. Reichliche Zellteilungsfiguren und zahlreiche atypische Mitosen vervollständigten das Bild. Gefäßquerschnitte waren selten zu sehen, dementsprechend verliefen die zentralen Partien mehr oder weniger ausgedehnten Degenerationsprozessen.

Das verwandte Mäufecarcinom zeigte drüsigen Aufbau; regellos angeordnete — „labyrinthartige“ — verzweigte Schläuche, von zylindrischen Epithelzellen ausgekleidet, mit vergrößerten und veränderten Zellformen, die keine Sekrete mehr lieferten. Stellenweise war die Epithellage einschichtig und der Drüsencharakter dadurch deutlicher erhalten; stellenweise lagen mehrere Schichten und größere Zellhaufen zusammen, die nicht mehr von Basalmembranen umgrenzt wurden. Am Rand wuchsen die Drüsenelemente infiltrierend in das gesunde Gewebe.

Als genügend Tumortiere zur Verfügung standen, begannen die Versuche. Die praktische Ausführung gliederte sich in folgende Serien:

- Versuchreihe 1: Prüfung der Wirkung des Toxins von B. Novyi auf gesunde Ratten und Mäuse. (Zu den Versuchen wurden 35 Mäuse und 15 Ratten verwendet.)
- Versuchsreihe 2: Prüfung der Wirkung einer Aufschwemmung mit gleichbleibender Keimzahl von *Saccharomyces farciminosus* auf gesunde Ratten und Mäuse (35 Mäuse, 15 Ratten.)
- Versuchsreihe 3: Prüfung der Wirkung der intratumoralen Injektion (i.t.I.) des Toxins von B. Novyi auf Ca-Mäuse. (93 Versuchstiere, 91 Kontrolltiere.)
- Versuchsreihe 4: Prüfung der Wirkung der i.t.I. des Novyi-Toxins auf Sarkom-Ratten. (45 Versuchstiere, 45 Kontrolltiere.)
- Versuchsreihe 5: Prüfung der Wirkung der i.t.I. einer Aufschwemmung von *Saccharomyces farciminosus* auf Ca-Mäuse. (99 Versuchs-, 99 Kontrolltiere.)
- Versuchsreihe 6: Prüfung der Wirkung der i.t.I. einer Aufschwem-

dung S. f. auf Sarkom-Ratten. (37 Versuchstiere,
35 Kontrolltiere.)

Zur Prüfung der Einwirkung der Erreger auf das tumortragende Tier wurde verwandt:

1. die durchschnittliche Lebensdauer,
2. die histologische Untersuchung,
3. die Stoffwechseluntersuchung von Tumorschnitten nach O. Warburg,
4. die Prüfung der Transplantationsfähigkeit des Tumorgewebes auf frische Versuchstiere (aus einem Wurf, dessen Tumoresistenz prozentual festgestellt worden war).

(Die Bewertung nach Punkt 1. und 2. ist allgemein üblich, die nach 3. und 4. neu und recht brauchbar.)

Ergebnisse der Versuchsreihen 1, 3 und 4: Toxinwirkung von B. Novyi auf normale und tumortragende Ratten und Mäuse.

Der Novyische Bazillus des malignen Oedems³⁸ ist ein kleines, peritrich gekeißeltes Stäbchen, das in der Jugendform gram-positiv, später gram-negativ ist. Er ist obligater Anaerobier, zeigt üppiges Wachstum in Leberbouillon und ist für alle Tiere, besonders die üblichen Laboratoriumstiere sowie für den Menschen hochpathogen. In Bouillonkulturen sondert er ein Toxin ab; das Filtrat hat vom 3. bis zum 6. Kulturtag die größte Wirksamkeit. Es ist thermolabil und wird durch Alkohol und Ammonsulfat zerstört.

Die Dosis letalis wurde für die weiße Maus (15 g Gewicht) mit 0,19 ccm subcutan der Verdünnung 1 : 1000 bestimmt, eine Ratte im Durchschnittsgewicht von 48 gr wurde durch 0,55 subcutan eben getötet.

Als Versuchsdosen wurden entsprechend 0,12 ccm resp. 0,45 ccm verwendet.

Die Injektion verursachte bei Ratten und Mäusen in der näheren, seltener auch weiteren Umgebung des Depots ein mehr oder minder blutiges, manchmal farbloses, fulzig glasiges Oedem des Subcutis und der tieferliegenden Schichten, manchmal (bei Überdosierung?) fanden sich kleine Gasbläschen im Gewebe. Bei tödlichen

Dosen wurde bei der Sektion regelmäßig ein farbloser bis rötlicher Erguß in der Bauch- und Pleurahöhle gefunden.

Nach etwa sechs Tagen begann der Prozeß sich zurückzubilden, palpatorisch (ganz zweckmäßig mit einer biegsamen Sonde vorzunehmen) war eine schärfere Begrenzung und Verhärtung des infiltrierten Gewebes bis zur Narbenbildung zu fühlen. Mikroskopische Schnitte zeigten reichliche Bindegewebsneubildung, besonders in der Umgebung der Blut- und Lymphgefäße; die Gefäßlichtungen waren im ganzen verengt und schienen streckenweise gänzlich verödet. Nach diesen Vorbereitungen wurde in Impftumoren in verschiedenen Zeitabständen nach der Tumorpfropfung die Versuchsdosis injiziert; weiterhin bei 12 Mäusen und 7 Ratten in das vorher durch Toxinwirkung verödete Gewebe Krebsbrei injiziert, um einen Impftumor zu erzeugen.

Es ergab sich:

1. Bei beiden Tieren war in keinem Fall in dem narbig veränderten Gewebe ein Tumor implantabel (12 Mäuse, 7 Ratten).
2. Die Lebensdauer der mit Toxin behandelten Tiere (93 Mäuse, 45 Ratten) war durchschnittlich bei Mäusen 14 Tage, bei Ratten 22 Tage länger als die der unbehandelten Tiere (91 Mäuse und 45 Ratten), das entspricht einer Verlängerung von 25% seit Krankheitsbeginn. Die Tumoren blieben in der ganzen Zeit hart und deutlich verkleinert gegenüber den unbehandelten, im Terminalstadium — etwa 5 Tage — wucherten sie allerdings erheblich.
3. Die histologische Untersuchung bei 37 Mäusen und 19 Ratten zeigte übereinstimmend ausgedehnte Rückbildungsvorgänge im Sinne der Fettmetamorphose, hyalinen Degeneration, Pyknose und Karyolyse der Zellen. Häufig bildeten sich demarkierende Entzündungszonen; die Erfahrung lehrte, daß gerade diese Fälle zu Ulceration und Verjauchung neigten. Gewöhnlich am Rande, manchmal auch mehr zentral lagen kleinere Reste von anscheinend unverändertem Sarkomatösem oder carcinomatösem Gewebe.

4. Die manometrische Untersuchung des Atmungs- und Gärungstoffwechsels nach O. Warburg wurde bei 16 Mäusen und 10 Ratten durchgeführt. Es ergab sich, daß das mit Toxin behandelte Geschwulstgewebe eine Atmungsgröße von durchschnittlich 37% O₂-Verbrauch bei Mäusen (Grenzwerte 2,3—81%) und 42% bei Ratten (Grenzwerte: 5,1 bis 98%), demnach eine Glykolyse von ca. 63% und 58% aufwies. Unbehandeltes Tumorgewebe oxydiert dagegen von 13 Molekülen Zucker nur 1 Molekül und spaltet 12 (= 7,7 zu 92,3%); normales erwachsenes Gewebe zeigt keine Glykolyse (= 100% O₂-Verbrauch).
5. Eine Untersuchung auf Erhaltung der Transplantationsfähigkeit wurde bei 15 Mäusen und 4 Ratten durchgeführt. Von jedem Tier wurde nach der eingangs beschriebenen Methode ein Krebs- bzw. Sarkomzellbrei hergestellt, der jeweils 5 Tieren, die nicht tumorresistenten Würfen entstammten, injiziert wurde. In keinem Falle ließ sich bei sämtlichen 60 resp. 20 Tieren (Mäuse und Ratten) ein Tumor überimpfen.

Ergebnisse der Versuchsreihen 2, 5 und 6: Einwirkung von Aufschwemmungen von *Saccharomyces farciminosus* auf normale und tumortragende Tiere.

Der *Saccharomyces farciminosus* (Tokishige)³⁹ ist der Erreger der Lymphangitis epizootica, einer langsam verlaufenden Entzündung der Lymphwege im Sinne einer Peri- und Paralymphangitis chronica, die zur Thrombosierung und Verödung der befallenen Lymphwege führt. Die Krankheit ist übertragbar, besonders leicht auf den Einhufer, auch auf den Menschen, während die Pathogenität des Erregers auf die üblichen Laboratoriumstiere nicht einheitlich beurteilt wird.

Die Übertragung auf die zur Verfügung stehenden Ratten und Mäuse war mit großen Schwierigkeiten verknüpft. Die subkutane Injektion führte im allgemeinen zur Abszedierung und Ulceration, auch Wiederholung ergab keine besseren Erfolge. Daher bin ich dem wissenschaftlichen Laboratorium der Behringwerke zu Dank

verpflichtet, das mir durch Vermittlung von Herrn Prof. Herzberg (Düsseldorf) Auffschwemmungen von Kulturen zur Verfügung stellte, die auf flüssigen Nährböden gewachsen waren und bedeutend bessere Infektions-Resultate lieferten.

Die Injektion einer Auffschwemmung von 20 000 000 Keimen-ccm ergab bei 35 Mäusen (0,4 ccm) und 15 Ratten (2,5 ccm) in 27 resp. 13 Fällen eine sich im Verlauf von durchschnittlich 9 resp. 11 Tagen entwickelnde derbe über die Umgebung erhabene Infiltration, die nach etwa 20tägigem Bestehen bindegewebig-narbig zurückgebildet wurde.

Histologisch bot sich in diesem Stadium das Bild einer chronisch verlaufenden Entzündung mit Proliferation der Gefäßendothelien, Bildung von Fibroblasten und Ansammlung zahlreicher Plasmazellen. Die Gefäßwandungen waren erheblich verdickt, schienen durch dicke neugebildete perivaskuläre Bindegewebsmassen zusammengedrückt und stellenweise stenosierte zu werden.

Die Versuche wurden in der gleichen Reihenfolge wie bei B. Novyi durchgeführt und ergaben:

1. In das durch Injektion von S. f.-Auffschwemmung entzündete und wieder abgeheilte Gewebe ließen sich keine Tumoren implantieren (10 Mäuse, 13 Ratten).
2. Die Lebensdauer der behandelten Tiere (99 Mäuse, 37 Ratten) war im Durchschnitt 10 resp. 16 Tage länger als die der unbehandelten Kontrolltiere (99 und 35), das entspricht einer Verlängerung von ca. 17% seit Krankheitsbeginn. Die Tumoren waren ebenso wie bei Novyi-Einwirkung erhärtet und verkleinert, um nur einige Tage vor dem Tod der Tiere stärker zu werden.
3. Die histologische Untersuchung von Schnitten durch die Tumoren von 32 Mäusen und 18 Ratten ergab die gleichen Degenerationsercheinungen, wie sie bei der Untersuchung der B. N. behandelten Tumoren geschildert wurden.
4. Die Untersuchung des Atmungs-Stoffwechsels ergab bei 16 Mäusen und 10 Ratten eine Senkung des O₂-Verbrauchs von durchschnittlich 25% beim Mäuscarcinom

(Grenzwerte: 8,9—47,5%) und 17% beim Rattenfarkom 1,4—32,7%).

5. Transplantationsfähig war von den geprüften 15 Mäuse- und 6 Rattentumoren ein Rattenfarkom, das bei der Überimpfung auf 5 Tiere bei 3 derselben ein neues Sarkom erzeugen konnte. Zwei führten in der üblichen Zeit (7 Wochen) zum Tode, eins bildete sich spontan zurück.

Kritische Zusammenfassung.

Die Verödung der Gefäß- insbesondere der Lymphbahnen des Geschwulstbettes beeinflusst die Tumoren derart, daß die Metastasenbildung verhindert, die Lebensdauer der Tiere verlängert, eine Schädigung des Tumors im Sinne histologisch nachweisbarer verstärkter Nekrose, mangelnder Transplantationsfähigkeit und verringerter Glykolyse des Tumor-Gewebes als Ausdruck eines gestörten Stoffwechsels als gesichert angenommen werden muß.

Allerdings kranken die vorgenommenen Versuche an einem Übelstand: Die Einwirkung des B. Novyi ist nicht genau genug dosierbar, außerdem kann das Toxin nicht mehrfach angewendet werden, weil die Giftigkeit doch zu groß, die „therapeutische Wirkungsbreite“ also zu schmal ist.

S. farciminosus wächst dagegen zu langsam, sodaß ein zu großes Mißverhältnis zwischen dem oft rapiden Wuchern des Tumorgewebes und der langsamen Infiltration durch die Infektion zu Ungunsten der Infektion besteht.

Ich plane, zu gegebener Zeit die Versuche fortzusetzen und zwar mit nicht haemolisierenden Streptokokken, die mir Herr Dr. Beadle vom Londoner Tropenhygienischen Institut empfahl. Allerdings sind die Schwierigkeiten erheblich. Dr. Beadle, ein ausgezeichnete Kenner dieses Gebietes, schreibt mir: „... Über die Dosierung muß ich einschalten, daß diese manchmal sehr lästig und schwierig ist; es braucht jedenfalls etwas Erfahrung und Geduld. Die Schwierigkeiten sind zwei: Die Virulenzversuche müssen auf

statistische Methoden gegründet sein, Arbeit mit vielen Tieren ist notwendig. Es ist manchmal höchst schwierig, die Virulenz, nachdem sie mit vieler Mühe bestimmt ist, konstant zu halten, sie wechselt immer sehr bei der langen Züchtung auf künstlichen Nährböden.“

Die Arbeit ist die gleiche wie die der Hervorrufung eines künstlichen Erysipels, nur daß ich nicht von der Annahme eines Antagonismus zwischen Erysipelkokkus und Tumorzelle usw. ausgehe, wie die bisherigen Autoren, sondern die Hauptaufgabe in der Verstopfung der Kapillaren und besonders der Lymphkapillaren sehe. Dieses Ziel müßte zu erreichen sein.

Literatur und Angaben.

- 1.) 2 Fälle, beobachtet in der Chir. Klinik d. Med. Akad. Düsseldorf (Prof. Dr. Frey) und der Chir. Univ.-Klinik Würzburg (Dir.: Prof. Dr. König). 2.) Busch, Berl. klin. Wschr. 1866. 3.) Durante, Ind. a. diagn. chir. d. tumori, Rom 1876; Trattato di path. et. ter. chir. Rom 1896. 4.) Mofengeil, Arch. f. klin. Chir. Bd. XII. 5.) Biedert, Dtsche. med. Ztg. 1896. 6.) Bruns, Beitr. klin. Chir. 1886. 7.) Gerster, Rep. of N. Y. surgical society. 8.) Bull, An. of surgery 1891. 9.) Hutchison, Ar. of clinic. surg. 1892. 10.) Fenney, zitiert n. Coley, Amer. journ. of med. 1893. 11.) Kleeblatt, M.M.W. 1890. 12.) Nach einer privaten Mitteilung von Herrn S. Beadle M.D., London (Tropenhyg. Institut). 13.) R. Müller, Lehrbuch der Hygiene, Lehmann 1935. 14.) Emmerich und Scholl, D.M.W. 1895. 15.) Richet und Hericourt, zit. n. Bruns, D.M.W. 1895. 16.) Coley, The americ. j. med. sc. 1, CVIII, Nr. 267 (1894). 17.) Czerny: M.M.W. 1895/36; Dtsche. med. W. 1895/43. 18.) Lassar, 19.) Sprouk, 20.) Friedrich, 21.) Winberg, zit. nach Bruns, D.M.W. 1895 Nr. 20. 22.) Kaposi, Lehrb. d. Hautkrankh. (1899). 23.) Strasser, in Kraus-Brugsch, Spez. Path. n. Ther. innerer Krankh. II, 2 (1919). 24.) Wolfheim, Z. klin. Med. 92, H. 4/6 507 (1921). 25.) Braunstein, Z. Krebsforschung, Bd. 29, Heft 5. 26.) Duschl, Dtsche. Z. Chir. Bd. 211, Heft 5 (1928). 27.) Okamoto, in O. Warburg, Stoffwechsel der Geschwülste, Springer, Berlin (1927). 28.) Warburg, O. (f. 27). 29.) Peterfen etc. Journal o. immun. Bd. IIX (1923). 30.) Kulenkampf, Hdb. d. path. Anat. der Tiere, Bd. 5 (1929). 31.) Unna, Hdb. der Dermatologie. 32.) Ackerknecht u. Krause, Pathologie d. Lymphgefäße im Hdb. der path. Anat. der Tiere, Bd. 5, S. 166 (1929). 33.) Winkler, i. Lubarsch-Ostertag, Hdb. d. P. 34.) Kitt, in Lubarsch-Ostertag, Hdb. d. P. 35.) Delbanco u. Callomon, Hdb. der Dermatologie. 36.) Goldmann, Beitr. klin. Chir. 18 (1897). 37.) Flacks, Z. Krebsforsch. Bd. 36, S. 476 (1932). 38.) Zeissler, in Kolle, Kraus, Uhlenbuth, Hdb. d. path. Mikroogr. (1929) Bd. IV, 1112—1117 u. Bd. X, 107—109. 39.) Baars, in Kolle, Kraus, Uhlenbuth, Hdb. d. path.-Mikroogr. (1929) Bd. IV, Teil II, S. 815.
-

Lebenslauf.

Geboren am 13. Juli 1912. Studium der Medizin vom S.S. 1930 bis zum W.S. 1935/36 an den Universitäten Halle, Graz, Würzburg (dort Physikum Oktober 1932), an der medizinischen Akademie Düsseldorf und der Universität Bonn, dort Staatsexamen S.S. 1936.
